

Lotta alla piralide del bosso preservando le api.

In questi giorni sono state osservate, in diverse parti della nostra regione, larve (bruchi) di piralide del bosso.

L'insetto, di recente comparsa nel nostro paese, compie tre o quattro generazioni in un anno e trascorre l'inverno come larva in un bozzolo tra le foglie delle piante colpite.

Le larve riprendono a nutrirsi all'inizio di aprile erodendo le foglie e, una volta completato lo sviluppo, danno origine alla prima generazione di adulti nel mese di giugno.

Le generazioni successive possono provocare danni fino alla fine dell'estate.

Le infestazioni primaverili possono coincidere con la fioritura del bosso, molto attrattiva nei confronti delle api e di altri insetti impollinatori. E' quindi opportuno adottare misure di lotta alle larve di piralide che non danneggino la salute umana e siano al tempo stesso rispettose di tutti gli organismi utili.

Come riconoscere le piante attaccate

Si riconoscono dalle sottili ragnatele bianche che avvolgono la vegetazione attaccata (all'interno delle quali sono visibili minuscoli escrementi) e dalle rosure sulle foglie.

Le larve appena nate si nutrono della pagina inferiore delle foglie, lasciando intatta quella superiore, mentre le larve mature attaccano l'intera lamina fogliare, lasciando intatta solo la nervatura centrale. Le larve, che a maturità raggiungono i 3-4 centimetri, hanno capo nero e corpo verde giallastro con punti neri.

Come combatterla preservando l'ambiente

In caso di deboli infestazioni è possibile far cadere i bruchi scuotendo la pianta. I bruchi caduti andranno raccolti e soppressi.

Per controllare forti infestazioni si possono utilizzare insetticidi microbiologici a base di *Bacillus thuringiensis var. kurstaki*, un batterio che, se ingerito dalle larve, ne provoca la morte in breve tempo. Questi prodotti, facilmente reperibili in commercio, non sono particolarmente tossici per l'uomo e non pregiudicano la vita delle api e degli altri organismi utili.

Durante i trattamenti vanno eseguite le seguenti istruzioni:

- Realizzare una buona bagnatura della pianta per colpire le larve nascoste fra le foglie più interne delle siepi.

- Impiegare volumi medio alti e ripetere il trattamento qualora si verifichi una pioggia intensa nelle sei ore successive.
- In presenza di acqua con pH alcalino è opportuno acidificare la soluzione acquosa.
- Eseguire il trattamento nelle ore serali e ripeterlo, con le stesse modalità, a distanza di qualche giorno.
- Evitare di trattare in presenza di fiori sulla pianta. I formulati a base di *Bacillus thuringiensis* var. *kurstaki* sono innocui per le api e per i pronubi selvatici, ma durante il periodo della fioritura la legislazione regionale vigente (art. 15 della Legge regionale n. 35 del 25 agosto 1988, Decreto Regionale 4 marzo 1991 n.130) vieta qualsiasi trattamento con insetticidi.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del Servizio Fitosanitario Regionale http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/comunicati-stampa/2014/settembre/Piralidepieghevole2.pdf/at_download/file/Piralide%20pieghevole2.pdf e/o contattare i tecnici del C.A.A. "Giorgio Nicoli" S.r.l. (051/6802227).



